

DIPARTIMENTO MEDICINA TRASFUSIONALE PROVINCIALE DI TREVISO

ATTUALI CRITERI DI ESCLUSIONE TEMPORANEA DEL CANDIDATO DONATORE DI SANGUE AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA SALUTE DEL RICEVENTE

SITUAZIONI PIU' FREQUENTI

2-28 giorni:

- Vaccinazioni

15 giorni:

- Febbre superiore ai 38°
- Sindrome influenzale
- Assunzione di antibiotici o antinfiammatori: le varie terapie avranno un periodo di rinvio temporale variabile secondo il principio attivo dei farmaci prescritti e secondo la malattia oggetto di cura

2 mesi:

- Cure odontoiatriche compresi gli interventi di implantologia
- Interventi chirurgici ambulatoriali (d-surgery)

3 mesi:

- Soggiorno in zona tropicale
- Puntura di zecca asintomatica

4 mesi:

- Interventi chirurgici maggiori *
- Esami endoscopici con strumenti flessibili (gastroscopie, colonscopie, artroscopie, isteroscopie, laparoscopie)
- Agopuntura (aghi monouso)
- Piercing - tatuaggi

- Contaminazione delle mucose con sangue o lesioni da ago
- Trasfusione di emocomponenti o somministrazione di emoderivati *
- Trapianto di tessuti e/o cellule di origine umana *
- Rapporti sessuali con persona infetta o a rischio di infezione da Epatite B, Epatite C, HIV **
- Rapporti sessuali occasionali a rischio di trasmissione di malattie infettive **
- Stretto contatto domestico con persone affette da Epatite B

*Rimane comunque importante la valutazione della patologia di base

**I comportamenti periodici sessuali a rischio di contrarre gravi malattie infettive comportano l'esclusione permanente dalle donazioni.

6 mesi:

- Soggiorno in zona malarica
- Toxoplasmosi
- Mononucleosi infettiva
- Malattia di Lyme
- Interruzione della gravidanza

1 anno:

- Gravidanza (dopo il parto)

Il medico, responsabile della selezione del candidato donatore, valuterà gli eventuali periodi di sospensione in relazione alle condizioni di salute o alle patologie meno comuni secondo decreto ministeriale.